


馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

藥品名稱： Perindopril arginine 5mg
film-coated tab

英商品名： ACERTIL* 5mg FC tab

中文藥名： 雅施達 膜衣錠

藥品代號： 22511



□藥品作用簡介：(一種藥可能會有許多不同療效, 如您的病情治療與以下所述有差異時, 請與我們聯絡)

本藥是一種血管收縮素轉化酶抑制劑，該酵素可將 AgI 轉換成具有血管收縮作用的血管收縮素 11(Ag11)，將具有血管擴張作用的 bradykinin 分解成不具活性的庚鈦(heptapeptide)，用來治療高血壓或充血性心衰竭。

□一般用法：(醫師會因各種因素而調整藥品劑量, 您藥袋上之用法與以下所示用法將會稍有差異, 如有疑問請與我們聯絡)

1. 通常一天一次，飯前服用，有時可能會隨血壓控制來調整劑量。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

□忘記服藥時該怎麼辦？

想起來的時候，儘快補吃。但若已接近下次服藥時間時，則不要補吃，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。

□服藥時之注意事項：

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
 2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是阿斯匹靈、降血糖藥、利尿劑，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
 3. 如果您有或曾經有腎及肝臟等疾病，應告知您的醫師。
 4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
 5. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。
- 請儲存於緊密容器，室溫儲存，並慎防兒童取用。

□儲存方法：

室溫儲存

□飲食方面之注意事項：

如果醫囑低鹽低鈉飲食，請小心遵守。使用含鉀代鹽之前，請告知您的醫師。

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

☐藥品副作用與處置方法：

雖然副作用是不常見，但仍有可能會發生。

1. 如果以下副作用變嚴重或持續存在，請告知您的醫師：噁心、虛弱、頭痛、胃痛、眩暈、情緒不穩定、味覺改變、低血壓、乾咳等。
2. 如果您有以下任何症狀，請立即告知醫師：低血壓、水腫、嚴重的乾咳等。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
