

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

藥品名稱： captopril 25mg tab

英商品名： CEPORIN* Tab 25mg

中文藥名： 血樂平錠

藥品代號： 22469



□ **藥品作用簡介：** (一種藥可能會有許多不同療效, 如您的病情治療與以下所述有差異時, 請與我們聯絡)

1. 用於治療高血壓及心衰竭。
2. 使血管擴張, 減輕心臟負擔。

□ **一般用法：** (醫師會因各種因素而調整藥品劑量, 您藥袋上之用法與以下所示用法將會稍有差異, 如有疑問請與我們聯絡)

1. 通常一天二至三次, 空腹服用, 於飯前 1 至 2 小時服用。
2. 必須遵醫囑常規服藥, 不可自行更改劑量或自行停藥。

□ **忘記服藥時該怎麼辦？**

想起來的時候, 儘快補吃。但若已接近下次服藥時間時, 則不要補吃, 只服用一次劑量即可, 千萬不要服用雙倍的劑量。

□ **服藥時之注意事項：**

1. 服藥前, 請先告知您的醫師, 是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前, 請先告知您的醫師, 您目前正在服用的其它藥物, 特別是利尿劑、lithium、其他高血壓用藥、鉀補充劑及維他命, 因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有腎及心臟等疾病, 應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳, 請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕, 也請立即告知醫師。
5. 請勿自行將藥拿給別人吃, 以免發生意外。
6. 請儲存於緊密容器, 室溫儲存, 並慎防兒童取用。
7. 如果您計劃手術, 包括牙科手術, 請事先告知您的醫師或牙醫, 您正服用本藥。

□ **儲存方法：**

室溫儲存。

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

□飲食方面之注意事項：

1. 使用含鉀的替代鹽，請告知您的醫師。
2. 如果醫囑低鹽低鈉飲食，請遵照醫師指示。

□藥品副作用與處置方法：

雖然副作用是不常見，但仍有可能會發生。

1. 如果以下副作用變嚴重或持續存在，請告知您的醫師：眩暈、金屬味覺或味覺遲緩、咳嗽、喉嚨痛、發燒、不正常淤青、心跳過快、疲倦等。

如果您有以下任何症狀，請立即告知醫師：皮膚發疹、胸痛、四肢、眼、唇或舌腫脹、吞嚥困難、呼吸困難、昏厥等。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
