

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

藥品名稱：複方 Amlodipine 5mg & Valsartan
160mg

英商品名：複方 EXFORGE* film-coated tab
5/160mg

中文藥名：易安穩膜衣錠 5/160 毫克

藥品代號：22512



□藥品作用簡介：(一種藥可能會有許多不同療效，如您的病情治療與以下所述有差異時，請與我們聯絡)

1. 降血壓劑，含血管加壓素 II-接受體拮抗劑與鈣離子阻斷劑。
2. 作為以上單方製劑無法良好控制血壓的第二線用藥

□一般用法：(醫師會因各種因素而調整藥品劑量，您藥袋上之用法與以下所示用法將會稍有差異，如有疑問請與我們聯絡)

1. 建議一天服用一次膜衣錠，可隨餐或空腹服用。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

□忘記服藥時該怎麼辦？

想起來的時候，儘快補吃。但若已接近下次服藥時間時，則不要補吃，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。

□服藥時之注意事項：

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是巴比妥類安眠藥、抗癲癇藥物、抗血栓藥物、細胞毒性藥物、抗黴菌藥物、鋰鹽、抗生素藥物、非類固醇消炎藥、保鉀利尿劑、含鉀用藥，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有肝功能障礙、腎功能障礙，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。
6. 請儲存於緊密容器，室溫儲存，並慎防兒童取用。
7. 如果您計劃手術，包括牙科手術，請事先告知您的醫師或牙醫，您正服用本藥。
8. 服用期間，偶有暈眩或疲倦發生，開車或操作機械時應小心。

□儲存方法：

室溫儲存。

□飲食方面之注意事項：

1. 如果醫囑低鹽低鈉飲食，請小心遵守。使用含鉀代鹽之前，請告知您的醫師。
2. 在服藥期間避免喝葡萄柚汁。

馬偕紀念醫院民眾用藥資訊衛教單

□藥品副作用與處置方法：

1. 副作用包括頭痛(當你開始服用期間，可能會出現頭痛，但這通常持續很短時間。隨著治療期間增加，頭痛會變得較不明顯)、頭暈目眩、鼻咽炎、上呼吸道感染、咳嗽、腹痛，而症狀可能在治療期間消失。如果情況持續或令你感到不安，應向醫生查詢。
2. 如果出現周邊性水腫、心跳快或慢（低於 50 beats/min）、呼吸困難或皮疹或騷癢，儘快向醫生查詢。
3. 如果你出現其他未有提及的作用，應與醫生或藥師聯絡。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
